

LIITE 7. VAIKUTTAVUUSTUTKIMUSTEN TULOKSET

Hoito on merkitty vaikuttavaksi (+), kun hoitoa saaneilla ilmeni tavoiteltu hoitotulos tilastollisesti merkitsevästi useammin ($p < 0.05$) kuin vertailuhoidolla. Taulukon tarkemmat lukuohjeet ja lähteet ovat taulukon alla ennen lähdeluetteloa.

Lääke- ja päihderiippuvuuksien psykososiaalinen hoito

1. Tupakka

<i>Hoito</i>	<i>Vaiikut-tavuus</i>	<i>Mihin ver-rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näy-tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Käyttäytymiste-rapiat kuten motivoiva ohjaus nuorille	+	TAV	tupakoinnin lopetta-minen	B	(Ollila 2011a)
<ul style="list-style-type: none"> • puheli-mitse (teksti-viestit, puhelut) aikuisil-le 	+	EI, TAV	tupakoinnin lopetta-minen	A	(Whittaker ym. 2016)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	TAV	tupakoinnin lopetta-minen ja kognitiivinen toimintakyky	A	(Dragiotti ym. 2017)
Tukea ja ohjausta tarjoavat vastaan-ottokäynnit	+	TAV (puhe-limitse)	tupakoinnin lopetta-minen	A	(Dragiotti ym. 2017)
Ryhmäohjaus	+	EI, MUU (opas)	tupakoinnin lopetta-minen	A	(Ollila 2011b)

2. Alkoholi

<i>Hoito</i>	<i>Vaiukutta-vuus</i>	<i>Mihin ver-rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu-los</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapia-muodot	+	TAV, EI	alkoholin käytön vähentäminen	B	(Dragiotti ym. 2017; Simojoki 2015)
Käyttäytymiste-rapia	0	TAV, EI	retkahdusten määrä	B	(NICE 2011)
Kognitiivinen käyttäyty-misterapia	+	TAV	alkoholin käytön vähentäminen, retkahdusten määrä	B	(NICE 2011) (Simojoki 2015)
Lyhytneuvonta (< 5 h, <4 viikon aikana) nuorilla (11-30 v)	+	EI, TAV	alkoholin kokonais-kulutuksen lasku, alkoholiin liittyvien ongelmien vähene-minen	A	(Tanner-Smith ja Lipsey 2015; Terlecki ym. 2015)
Lyhytneuvonta 2. asteen oppi-laitoksessa	+	EI	Alkoholin käyttö-kertojen vähenemi-nen	B	Carney ym. 2016

	0	EI	Alkoholin kokonaiskulutuksen lasku	C	
Lyhytneuvonta perusterveydenhuollon potilaille (ei vaikea riippuvuus)	+	EI, TAV	alkoholin kulutuksen lasku 3,6 annosta/viikko, kohtuukäytön yleistymisen, runsaan kertaikäytön harveneminen	B	Jonas ym. 2012
Lyhytneuvonta sairaalahoidossa oleville alkoholin suurkuluttajille (>16 v).	+	TAV	alkoholin kokonaiskulutuksen lasku	B	McQueen ym. 2011
Lyhytneuvonta sairaalahoidossa oleville nuorille (<21 v)	0	EI, TAV	alkoholin kokonaiskulutuksen lasku	B	Newton ym. 2013; Cunningham 2015)
alkoholin suurkuluttajille	0	EI, TAV	alkoholin käytön negatiiviset seuraukset	C	Newton ym. 2013; Arnaud ym. 2017
Motivoiva haastattelu	+	TAV, EI	alkoholin käytön vähentäminen	B	(Sayegh ym. 2017) (NICE 2011)
Motivoiva haastattelu korkean riskin nuorilla (alle 25 v)	+	EI, TAV, MUU	alkoholin kokonaiskulutuksen ja käytönmäärien lasku	B	Foxcroft ym. 2016
	+		alkoholin käytön negatiiviset seuraukset	C	
	0		humaltumishakui- nen juominen	B	
Motivoiva haastattelu sairaalahoidossa oleville nuorille (13-25 v) alkoholin suurkuluttajille	+	TAV	alkoholin käyttöker- tojen harveneminen	B	Kohler ym. 2015
	0		alkoholin kokonais- kulutuksen lasku	B	
Motivoiva haastattelu + retkahdusten ehkäisy	+	TAV, EI	alkoholin käytön vähentäminen	B	(NICE 2011)
Ohjattuun itsehoitoon perustuva terapia	+	TAV	alkoholin käytön vähentäminen	B	(NICE 2011)
Perheterapia lapsille (<18 v)	+				
Verkkoterapiat aikuisille ja nuorille	0	EI	alkoholin käytön vähentäminen	C	(Balhara ja Verma 2014)

3. Huumausaineet

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu- los</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapiamuodot					
• opioideja ja stimulantteja käyttävät	0	TAV	alkoholin käytön vähentäminen	C	(Klimas ym. 2014)
• huumeita käyttävät naisrikolliset	0	TAV	huumeiden käytön vähentäminen	C	(Perry ym. 2015)
	+	TAV	uudelleen vangitsemisten vähentäminen	B	(Perry ym. 2015)
• raskaana olevat huumeita käyttävät naiset	0	TAV	ennenaikaisten synnytysten vähentäminen, syntymäpainoltaan pienten vauvojen osuus, huumeiden vaikutuksen alaisena synnyttäneiden osuus	B	(Terplan ym. 2015)
Verkkointerventiot	+	EI, TAV	huumeiden käytön vähentäminen	B	(Boumparis ym. 2017)
Motivoiva haastattelu	+	TAV	päihteiden (tupakka, kannabis, stimulantit, yhteiskäyttö) käytön vähentäminen	B	(Sayegh ym. 2017)
• nuorilla (12-23 v)			alkoholin ja huumeiden käytön vähentäminen	B	Jensen 2011
• opioideja ja stimulantteja käyttävät	+	TAV	alkoholin käytön vähentäminen	B	(Klimas ym. 2014)
Palkkiohoito	0	TAV	päihteiden (tupakka, kannabis, stimulantit, yhteiskäyttö) käytön vähentäminen	A	(Sayegh ym. 2017; Benishek ym. 2014)

4. Bentsodiatsepiinit

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu- tulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	0	EI	bentsodiatsepiinien käytön vähentäminen	B	(Darker ym. 2015)
Motivoiva haastattelu	0	TAV	bentsodiatsepiinien käytön vähentäminen	D	(Darker ym. 2015)

5. Kannabis

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin ver- rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI /?	kannabiksen käytön vähentäminen, kannabiksen aiheuttamat ongelmat, riippuvuuden vakavuus	B	(Tacke 2012; Cooper ym. 2015)
Motivoiva haastattelu / motivaatiota lisäävä terapia	0	EI	kannabiksen käytön vähentäminen, kannabiksen aiheuttamat ongelmat, riippuvuuden vakavuus	C	(Cooper ym. 2015)
Lyhytneuvonta 2. asteen oppilaitoksessa	+	EI	kannabiksen käyttömäärien vähentyminen	B	Carney ym. 2016
	0	EI	kannabisriippuvuuden väheneminen	C	
Perheinterventiot nuorilla käyttäjillä	+	EI	itse raportoitu kannabiksen käytön väheneminen	B	Gates ym. 2006
	0		päihteettömyys	B	

6. Opioidit

<i>Hoito</i>	<i>Vaikut- tavuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Psykoterapiat (enimmäkseen KKT ja palkkiohoito) + lääkehoito	+	LÄÄ	opioidien käytön vähentäminen	B	(Dugosh ym. 2016)
Verkkointerventiot	+	EI, TAV	opioidien käytön vähentäminen	B	(Boumparis ym. 2017)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)	+	?	opioidien käytön vähentäminen	B	(Niemelä ja Aalto 2012)
Palkkiohoito	+	?	opioidien käytön vähentäminen	B	(Niemelä ja Aalto 2012)

7. Stimulantit: amfetamiinit ja kokaiini

<i>Hoito</i>	<i>Vaikut- tavuus</i>	<i>Mihin ver- rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	TAV	metamfetamiinista vieroitus	A	(Alho 2012; Lee ja Rawson 2008)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia + motivoiva ohjaus verkkoterapiana	0	EI	amfetamiinin käytön vähentäminen	B	(Tait ym. 2015)
	+	EI	avunhakemisen väheneminen	B	(Tait ym. 2015)
	+	EI	päihteettömien päivien määrä	B	(Tait ym. 2015)
Verkkointerventiot	0	EI, TAV	stimulanttien käytön vähentäminen	B	(Boumparis ym. 2017)
Motivoiva haastattelu	+	TAV	metamfetamiinista vieroitus	A	(Alho 2012)
Palkkiohoito	+	TAV	amfetamiinin käytön vähentäminen	C	(Reback ym. 2010)
	+	TAV	metamfetamiinista vieroitus	A	(Alho 2012; Lee ja Rawson 2008; Reback ym. 2010)
	0	TAV	kokaiinin käytön vähentäminen	C	(Reback ym. 2010; Terplan ym. 2015)

8. Peliriippuvuus

<i>Hoito (potilasryhmä)</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	0	EI, TAV	peliriippuvuuden helpottuminen	D	(Cowlshaw ym. 2012)
• verkkoterapiana	+	EI	peliriippuvuuden helpottuminen	C	(Noorani ja Severn 2010)
Motivoiva haastattelu	+	EI, TAV	pelaamistiheys	C	(Cowlshaw ym. 2012)
Intergratiivinen psykoterapia	+	EI, TAV	oireiden vakavuuden helpottuminen	C	(Cowlshaw ym. 2012)

Vakavien mielenterveysongelmien psykososiaalinen hoito

9. Itsetuhoiset aikuiset

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Palveluohjaus (case management)	0	TAV	itsetuhoisten tapahtumien väheneminen	B	Hawton ym. 2016

Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	TAV	itsetuhoisten henkilöiden väheneminen	C	Hawton ym. 2016
	0	TAV	itsetuhoisten tapahtumien väheneminen	C	
Dialektinen käyttäytymisterapia	+	TAV	itsetuhoisten tapahtumien väheneminen	C	Hawton ym. 2016
	0	TAV	itsetuhoisten henkilöiden väheneminen	C	
Ryhmämuotoinen tunteiden säätely-terapia	+	TAV	itsen vahingoittamisen vähentyminen	C	Hawton ym. 2016
Mentalisaatioterapia	+	TAV	itsen vahingoittamisen vähentyminen	B	Hawton ym. 2016

10. Itsetuhoiset lapset ja nuoret

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Psykososiaaliset hoidot	+	TAV	itsetuhoisuuden väheneminen	B	Ougrin ym. 2015
Terapeuttinen arviointi	+	TAV	hoitoon sitoutuminen	C	Hawton ym. 2015
	0		itsetuhoisten tekojen toistuminen	C	
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	0	TAV	itsetuhoisuuden toistumisen väheneminen	D	Hawton ym. 2015
Nuorten dialektinen käyttäytymisterapia (DBT-A)	+	TAV	Itsetuhoisuuden väheneminen	C	(Pistorello ym. 2012); Mehlum ym. 2014 ja 2016
	0	TAV	Itsetuhoisten henkilöiden osuuden pienentyminen	C	c
	0	TAV	Epävakaisten oireiden merkittävä väheneminen	C	Mehlum ym. 2014
Perheinterventio, itsemurhaa yrittäneillä nuorilla	0	TAV	Itsemurhayrityksen uusiutuminen	C	Hawton ym. 2015
Perheinterventio yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon,	+	TAV	Itsetuhoisuuden väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Ryhmäterapia, nuorilla, joilla esiintynyt itsetuhoisuutta useita kertoja	0	TAV	Itsensä vahingoittamisen uusiutuminen	C	Hawton ym. 2015

Kognitiivisana-lyttinen psykoterapia	+	TAV	Epävakaiden oireiden merkittävä väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Tunteiden säätelyn taitoryhmä yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon	0	TAV	Epävakaiden oireiden väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Mentalisaatioon perustuva terapia nuorilla, joilla toistuvaa itsetuhoisuutta tai epävakaita oireita	+	TAV	Epävakaiden oireiden väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
	+	TAV	Itsetuhoisten henkilöiden osuuden pienentyminen	B	Hawtton ym. 2015
Vanhemmille suunnattu kasvatuseuvonta	+	EI	lapsen häiriökäyttäytymisen väheneminen, väkivaltaisten kasvatustapojen väheneminen	A	Arvonen ja Korkeila 2015

11. Samanaikainen vakava mielenterveys- ja päihdeongelma

Hoito (potilasryhmä)	Vaikutavuus	Mihin verrattuna?	Tavoiteltu hoitotulos	Näytön aste	Lähde
Kognitiivinen käyttäytymisterapia, KKT	0	TAV	kannabiksen käytön väheneminen, mielenterveys	C	(Hunt ym. 2013)
KKT + motivoiva haastattelu	0	TAV	päihteiden käytön väheneminen, mielenterveys	C	(Hunt ym. 2013)
Motivoiva haastattelu	0	TAV	päihteiden käytön väheneminen, mielenterveys	C	(Hunt ym. 2013)
• (rikolliset)	0	MUU (rentoutus)	pidätysten määrä, huumeiden käytön vähentäminen	B	(Perry ym. 2015)
	+	MUU (rentoutus)	uudelleenvangitsemisten määrän vähentäminen	B	(Perry ym. 2015)
Palkkiohoito	0	TAV	negatiiviset päihdevirtsanäytteet, sairaalahoitojen määrä	D	(Hunt ym. 2013)
Integroitu psykoterapeuttinen hoito	+	?	masennusoireiden väheneminen, huumeiden käytön vähentäminen	C	(Voroma 2012)

12. Psykoosiriskissä olevat nuoret

Hoito	Vaikutavuus	Mihin verrattuna?	Tavoiteltu hoitotulos	Näytön aste	Lähde
Kognitiivinen terapia	0	EI, MUU	Psykoosin ehkäisy	C	Gergov ym. 2015
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	0	MUU (supportiivinen terapia)	Psykoosin ehkäisy	C	Gergov ym. 2015

13. Psykoottinen häiriö nuorilla

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiiviseen käyt- täytymisterapiaan (KKT) pohjaava perheterapia	0	TAV	Relapsien väheneminen	C	Linsze n ym. 2001
KKT (relapsien ehkäisyterapia, kesto 7 kk)	+	TAV	Relapsien väheneminen	C	Gergov ym. 2015
KKT (varhaispsy- kooseille, kesto 3,5 kk)	0	MUU (aktiivi- nen keskustelu)	Oireiden väheneminen, toimintaky- vyn parane- minen	C	Gergov ym. 2015
Kognitiivis- analyttinen terapia	0	MUU (psy- koedukaatio)	Kognitiiviset taido, toimin- takyky	C	Gergov ym. 2015
Kognitiivinen kun- toutus	+	TAV	Kognitiivisen joustavuuden parantuminen	C	Gergov ym. 2015

14. Skitsofrenia

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu- los</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Psykoterapiat	+	EI, TAV	negatiiviset oireet, sosiaalinen toimin- takyky	B	(Dragiotti ym. 2017)
	0	TAV	kannabiksen käytön väheneminen poti- laililla, joilla yhtäai- kainen kannabison- gelma, oireiden väheneminen, elä- mänlaatu	B	(McLoughlin ym. 2014)
Kognitiivinen käyt- täytymisterapia	+	?	positiiviset ja nega- tiiviset oireet, toi- mintakyky	B	(Oksanen 2013a)
	+	?	positiiviset oireet	B	(Dragiotti ym. 2017)
• ryhmäte- rapiana	+	TAV	masennus, sosiaali- nen ahdistuneisuus, pelko	C	(Oksanen 2013b; Tran 2009)
Psykodynaaminen perheterapia	+	MUU (tukea antava neuvonta)	skitsofreniaoireiden lievittyminen	D	(Oksanen 2013c)
Psykoedukaatiivinen perheinterventio	+	TAV	uusiutumisen vähe- neminen, sairaala- jaksojen vähenemi- nen, lääkemyönty-	A	(Oksanen 2013e)

vyys					
Lyhyt perheterapia	0	TAV	uusiutumisen väheneminen, sairaalahoitjaksojen väheneminen	D	(Okpokoro ym. 2014)
KKT + motivoiva neuvonta + perheenjäsenten psykoedukaatio (skitsofreniapotilaat, joilla päihdehäiriö)	+	TAV	päihteettömien päivien määrä, oireiden väheneminen, sairaalajaksojen väheneminen, toimintakyky	C	(Honkonen 2007)
Kognitiivinen kuntoutus <i>Cognitive remediation</i>	+	TAV, MUU	kognitiivinen toimintakyky	A	(Dragiotti ym. 2017)
Tukea antava terapia	0	TAV, MUU (psykodynaaminen)	skitsofreniaoireiden lievittyminen	C	(Oksanen 2013d)

15. Harhaluuloisuushäiriö

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käytäytymisterapia	+	TAV	sosiaalinen itsetunto	D	(Skelton ym. 2015)

Mielialahäiriöiden psykososiaalinen hoito

16. Masennuksen hoito

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapiamuodot	+	EI, TAV	sosiaalinen toimintakyky	A	(Dragiotti ym. 2017)
	+	TAV, LU-MELääke	masennusoireiden väheneminen,	A	(Dragiotti ym. 2017)
	+	EI, TAV, LU-MELääke	elämänlaatu	A	(Dragiotti ym. 2017)
• akuuttivaiheen hoidossa	+	EI, TAV, MUU	masennusoireiden väheneminen, elämänlaatu	B	(Dragiotti ym. 2017; Lindfors 2014a)
	+	?	sosiaalinen toimintakyky	B	(Dragiotti ym. 2017)
• ylläpitohoitona	+	?	masennusoireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
• kroonisen masennuksen	+	?	masennusoireiden väheneminen	C	(Dragiotti ym. 2017)

sen hoidossa					
• subkliinisen masennuksen hoidossa	+	EI, TAV	masennushäiriön puhkeaminen	C	(Cuijpers ym. 2014a)
•					
• yli 50-vuotiailla	+	EI, TAV,	masennusoireiden väheneminen	A	(Cuijpers ym. 2014 b)
• ryhmäterapiana	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Murphy ja Spry 2009)
• puhelimitse	+	EI, TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Meskanen 2014b; Lindfors 2014b)
• verkkoterapiana	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	A	(Lindfors ja Stenberg 2014a)
• perusterveydenhuollossa	+	?	masennusoireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
Psykoterapia + lääkehoito	+	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen (myös pitkäkestoisesti), masennuksen uusiutuminen	A	(Dragiotti ym. 2017)
• akuuttihoitossa	+	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
• ylläpitohoitona	+	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen, masennuksen uusiutuminen	B	(Karyotaki ym. 2017; Lindfors 2014f)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI, TAV, LUMELÄÄKE	haitallisten ajatuskulkujen väheneminen	A	(Dragiotti ym. 2017)
• lyhytterapiana lievis- ja keskivaikeissa masennustiloissa	+	LÄÄ	masennuksen uusiutuminen	A	(Lindfors 2014g)
• ryhmäterapiana	+	Ei, TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Stevenson ym. 2010; Health Quality Ontario 2015)
• verkkoterapiana	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Karyotaki ym. 2017)
Tietoinen läsnäolo (Mindfulness)	0	?	masennusoireiden väheneminen	C	(Dragiotti ym. 2017)
	0	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	A	(Gotink ym. 2015)
• kroonisessa masennuksessa (yli 3 relapsia)	+	TAV	masennusoireet, masennuksen uusiutuminen, elämänlaatu	C	Gotink ym. 2015
Hyväksymis- ja omistautumisterapia	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017; Lindfors 2014i)
Käyttäytymisak-	+	TAV,	masennusoireiden väh-	A	(Lindfors

tivointi <i>Behavioral activation</i>		MUU	eneminen		2014i)
CBASP-yhdistelmäterapia (kroonisessa masennuksessa)	+	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014n)
CBASP-yhdistelmäterapia* + lääkahoito	+	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014n)
Psykodynaaminen terapia					
• pitkät terapiat	+	?	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors ja Stenberg 2014b)
• lyhyet terapiat	0	Ei, TAV	masennus, ahdistuneisuus ja somaattisten oireiden vähentyminen	B	(Abbass ym. 2014; Lindfors ja Stenberg 2014c)
Interpersoonallinen terapia					
• lyhytterapiana	+	EI, TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Swartz ym. 2014)
Ratkaisukeskeinen terapia	+	EI, MUU, LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	B	(Dragioti ym. 2017; Honkonen ja Pasternack 2008)
• lieväoireisessä masennuksessa	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	A	(Lindfors 2014j)
Psykoedukaatio ja itseapuoppaat	+	EI, TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014k)
Tukea antava terapia	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	B	(Dragioti ym. 2017; Marttunen 2014f)
Pariterapia tai perheterapia	+	EI, TTE (yksilö-), LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014m)
Kognitiivinen kuntoutus <i>Cognitive remediation</i>	+	?	masennusoireiden väheneminen	C	(Koponen ja Kinnunen 2014)
Positiivisen psykologian mukaiset interventiot	+	EI, TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Dragioti ym. 2017)

* The Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP). Kognitiivinen lyhytterapia, joka on kehitetty kroonisen masennuksen hoitoon. Käyttökelpoinen lievässä tai keskivaikeassa masennuksessa potilailla, joilla ongelmat liittyvät sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen.

17. Masennuksen hoito nuorilla

<i>Hoito</i>	<i>Vai- kut- ta- vuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu- los</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki tera- pamuodot	0	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen	B	(Das ym. 2016a)
	+	LÄÄ	itsemurha-ajatusten väheneminen	B	(Das ym. 2016a)
	0	LÄÄ+TTE	masennusoireiden väheneminen, itse- murha-ajatusten väheneminen,	B	(Das ym. 2016a)
Psykoterapiat + lääkehoito	0	LÄÄ	masennusoireiden ja itsemurha-ajatusten väheneminen, toi- mintakyky	B	(Das ym. 2016a)
	0	TTE	masennusoireiden ja itsemurha-ajatusten väheneminen	B	(Das ym. 2016a)
Kognitiivinen käyttäytymis- terapia	+	EI, TAV, MUU	masennusoireiden väheneminen	A	Marttunen ym. 2015
• ylläpito- hoitona	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Marttunen 2014b)
• masen- nuksen ja päihde- ongelman hoidossa	+	TAV	masennusoireiden ja päihdeiden käytön väheneminen	C	Babowitch ym. 2016
Kognitiivinen käyttäytymis- terapia + lääkehoito	+	LÄÄ	masennusoireiden väheneminen, itse- murha-ajatusten väheneminen	C	(Marttunen 2014c)
Interpersoo- nallinen tera- pia	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	A	(Pu ym. 2017; Mart- tunen ym. 2015)
Ratkaisukes- keinen terapia (hoitoresis- tentti depres- sio)	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Marttunen 2014e)
Pari- tai per- heterapiat	+	EI, TAV, MUU	masennusoireiden väheneminen	B	(Marttunen 2014g)

18. Masennuksen hoito raskaana olevilla ja synnytyksen jälkeen

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin ver- rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoi- totulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki terapiamuodot	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Stephens ym. 2016; Dennis ja Hodnett 2007; Lindfors 2014d)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014d)
Interpersoonallinen terapia	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014d)
Psykodynaaminen terapia					
• (raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen)	+	TAV, MUU	masennusoireiden väheneminen	B	(Lindfors 2014d)
• (synnytyksen jälkeen)	0	TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Dennis ja Hodnett 2007)

19. Masennuksen hoito somaattisesti sairailta

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin ver- rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoi- totulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki terapiamuodot	+	EI, TAV	masennusoireiden väheneminen	A	(Lindfors 2014e)
• sepelvaltimotautipotilailla	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Whalley ym. 2011)
• diabeetikoilla	+	EI, TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Baumeister ym. 2012)
	0	EI, TAV	elämänlaatu	C	(Baumeister ym. 2012)
• dementiapotilailla	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Orgeta ym. 2014)
• eturauhassyöpäpotilailla	0	TAV	masennusoireiden väheneminen	D	(Parahoo ym. 2013)

	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	B	(Parahoo ym. 2013)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia					
• sepelvaltimotautipotilailla	+	TAV	masennusoireiden väheneminen	C	(Baumeister ym. 2011)
	0		elämänlaatu	C	(Baumeister ym. 2011)
• keuhkoah- taumatautipoti- lailla	0	TAV	masennusoireiden väheneminen, elämänlaatu	C	(Health Quality Ontario 2015)

20. Kaksisuuntainen mielialahäiriö

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI, TAV	oireiden vähentyminen	C	(Tupala 2013)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia + lääkehoito	+	EI, TAV	uusiutumisten väheneminen	C	(Tupala 2013)
Psykoedukatio+lääkehoito	+	LÄÄ	oireiden vähentyminen	A	(Oksanen 2013f)
Psykologinen perheinterventio + lääkehoito	0	LÄÄ	oireiden vähentyminen, toipuminen	C	(Justo ym. 2007)
Ryhmäpsykoterapia	+	TAV	oireiden vähentyminen	B	(Murphy ja Spry 2009)
Kognitiivinen kuntoutus <i>Cognitive remediation</i>	+	?	oireiden vähentyminen	C	(Tuulio-Henriksson 2013)

Ahdistuneisuushäiriöiden ja somatoformisten häiriöiden psykososiaalinen hoito

21. Ahdistuneisuushäiriöt

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu- los</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapia- pamuodot	+	?	yleisen ahdistuneisuushäiriön oireiden ja sosiaalisen ahdistuneisuuden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
• verkkoterapiana	+	EI	oireiden väheneminen	B	(Mayo-Wilson ja Montgomery 2013)
• lapsilla ja nuorilla	+	?	oireiden väheneminen	A	(Bennett ym. 2016);
• nuorilla (13-22 v)	+	EI, MUU	oireiden väheneminen	A	Ranta ym.2015
• iäkkäillä	?	-	-	-	(Barton ym. 2014)
• dementiapotilailla	+	TAV	oireiden väheneminen	C	(Orgeta ym. 2014)
• sepelvaltimotautipotilailla	+	TAV	oireiden väheneminen	C	(Whalley ym. 2011)
• ärtyvän paksusuolen oireyhtymässä	+	TAV	mielenterveysoireiden väheneminen, fyysinen toimintakyky	A	(Dragiotti ym. 2017)
Kognitiivinen käytäytymisterapia	+	EI, LU-ME-lääke	ahdistuneisuuden väheneminen	A	(Dragiotti ym. 2017)
	+	?	sosiaalinen tai yleisen ahdistuneisuuden väheneminen, toimintakyky, elämänlaatu	C	(Dragiotti ym. 2017)
• ryhmäterapiana	+	TAV	oireiden väheneminen	B	(Mujoomdar ja Spry 2009)
	0	LÄÄ	oireiden väheneminen	C	(Mujoomdar ja Spry 2009)
• verkkoterapiana terapeutin tukemana, aikuisilla	+	EI, TAV	ahdistuneisuuden väheneminen	B	(Olthuis ym. 2016)
	0	TTE (vastaanotolla)	ahdistuneisuuden väheneminen	C	(Olthuis ym. 2016)
• lapsilla	+	EI, TAV	ahdistuneisuuden väheneminen, uusiutumisten esto	A	(Dragiotti ym. 2017), Wang ym. 2017

	+	LÄÄ	ahdistuneisuuden väheneminen, uusiutumisten esto	B	Wang ym. 2017
• nuorilla (13-22 v)	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	A	(Das ym. 2016b), Ranta ym. 2015
• lapsilla ja nuorilla	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	A	Bennett ym. 2016
Hyväksymis- ja omistautumisterapia	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
Tietoinen läsnäolo (Mindfulness)	+	TAV	oireiden väheneminen	B	(Gotink ym. 2015)
Psykodynaaminen psykoterapia	+	EI, TAV	lyhytkestoinen oireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
Huomioharjoittelu (attention bias modification therapy)	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
Meditaatio	+	EI, MUU	ahdistuneisuuden väheneminen	A	(Dragiotti ym. 2017)

22. Sosiaalisten tilanteiden pelko

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapiamuodot	+	?	yleisen ahdistuneisuushäiriön oireiden ja sosiaalisen ahdistuneisuuden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
• nuorilla	+	EI	oireiden väheneminen	B	Ranta ym. 2015
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	?	oireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
• verkkoterapia	+	EI, MUU (keskusteluryhmä)	oireiden väheneminen	C	(SBU 2007)

23. Paniikkihäiriö

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen terapia	+	EI, TAV, LUMETerapia	oireiden väheneminen	C	(Pompoli ym. 2016)
Käyttäytymisterapia	+	EI, TAV, LUMETerapia	oireiden väheneminen	C	(Pompoli ym. 2016)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI, TAV, LUMETerapia	oireiden väheneminen	C	(Pompoli ym. 2016)

• verkkoterapia	+	EI, MUU (keskusteluryhmä)	oireiden väheneminen	C	(SBU 2007)
• nuorilla (13-22v)	+	MUU (itsemonitorointiryhmä)	oireiden väheneminen	C	Ranta ym. 2015
Tukea antava (supportiivinen) psykoterapia	+	EI, TAV, LUMETERapia	oireiden väheneminen	C	(Pompoli ym. 2016)

24. Pakko-oireinen häiriö

<i>Hoito (potilasryhmä)</i>	<i>Vaikuttavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapiamuodot	+	LUMELääke	oireiden väheneminen	B?	(Skapinakis ym. 2016)
Kognitiivinen terapia	+	EI	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
	+	LUMETERapia	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
	+	LÄÄ	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
Käyttätymisterapia	+	EI	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
	+	LUMETERapia	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
	+	LÄÄ	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
• lapset ja nuoret	+	LUMELääke	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
	0	LUMETERapia	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
Käyttätymisterapia + lääke	+	LÄÄ	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
Kognitiivinen käyttätymisterapia	+	EI	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
	0	LUMETERapia	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
	0	LÄÄ	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
• lapset ja nuoret	+	EI	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016), Ranta ym. 2015
	0	LUMELääke, LUMETERapia	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
	0	LÄÄ	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
Kognitiivinen käyttätymisterapia + lääke	+	LÄÄ	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
• lapset ja nuoret	+	LUMELääke	oireiden väheneminen	B	(Skapinakis ym. 2016)
	0	LUMETERapia	oireiden väheneminen	C	(Skapinakis ym. 2016)
• nuoret (13-22v)	+	LÄÄ	oireiden väheneminen	B	Ranta ym. 2015

25. Traumaperäinen stressihäiriö

<i>Hoito (potilasryhmä)</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrattu- na?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapia- muodot lapsilla ja nuorilla	+	EI	Paraneminen	B	
	+	EI, TAV, MUU	oireiden väheneminen	A	(Dragiotti ym. 2017)
Psykoterapia + lääkehoito	+	LÄÄ	oireiden väheneminen	B	(Jonas ym. 2013)
Kognitiiviset psykoterapiat (pakolaiset ja turvapaikanhakijat)	+	TAV, MUU	oireiden väheneminen	B	(Punamäki 2014)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	B	(Dragiotti ym. 2017)
• ryhmäterapiana	+	EI, TAV, MUU	oireiden väheneminen	C	(Ponteva 2014)
• nuorilla	+	EI, MUU	toipuminen, oireiden väheneminen	B	Ranta ym. 2015
• lapsilla, joita on käytetty seksuaalisesti hyväksi	+	EI	oireiden väheneminen, käytösongelmien väheneminen	A	(Macdonald ym. 2012)
Psykoedukaatio	+	?	oireiden väheneminen	C	(Dragiotti ym. 2017)
Traumakeskeinen yksilöpsykoterapia (päänteiden käyttäjillä)	+	TAV	oireiden väheneminen	D	(Roberts ym. 2016)
Ei traumakeskeinen psykoterapia (päänteiden käyttäjillä)					
• yksilöterapiana	0	TAV	oireiden ja päänteiden käytön väheneminen	C	(Roberts ym. 2016)
• ryhmäterapiana	0	TAV	oireiden ja päänteiden käytön väheneminen	C	(Roberts ym. 2016)
Silmänliiketerapia (EMDR)	+	?	oireiden väheneminen	C	(Dragiotti ym. 2017)
	0	LÄÄ (fluoksetiini)	oireiden väheneminen	C	(Jonas ym. 2013)
• lapsilla	+	EI, TAV, MUU	oireiden väheneminen	C	Ranta ym. 2015
EEG- biopalautehoito	0	TAV	oireiden väheneminen	C	(CADTH 2012)
Virtuaalitodellisuusterapia (VRET, virtual reality exposure therapy)	+	EI, TAV	oireiden väheneminen	C	(Isoaho 2014)

26. Somatoformiset häiriöt

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrattu- na?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikkiterapiamuodot	+	EI, TAV	lääketieteellisesti selittämättömien fyysisten oireiden väheneminen	B	(van Dessel ym. 2014)
	+	EI, TAV	hypokondriaoireiden väheneminen	B	(Thomson ja Page 2007)
	+	EI	dysmorfisen ruumiinkuvan oireiden väheneminen	C	(Ipser ym. 2009)
Psykoedukaatio	0	EI	hypokondriaoireiden väheneminen	C	(Thomson ja Page 2007)

27. Unettomuus

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin ver- rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI	masennusoireet	B	(Ballesio 2017)
	0	EI	väsymys	B	(Ballesio 2017)
	+	EI	unettomuus, unenlaatu	A	(van Straten ym. 2017)
• ikääntyneillä	+	TAV	unettomuus	B	(Kajaste 2014)
• nettiterapiana	+	EI	masennusoireet	A	(Dragiotti ym. 2017)

Syömishäiriöiden psykososiaalinen hoito

28. Syömishäiriöt yleisesti

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin ver- rattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	TAV, MUU	subjektiivinen elämänlaatu	B	(Linardon ja Brennan 2017)
	+	TAV, MUU	terveyteen liittyvä elä-	B	(Linardon ja Brennan)

29. Laihuushäiriö (anoreksia)

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin ver- rattu- na?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Psykoterapiat	0	TAV	paino, hoitotu- los	D	(Hay ym. 2015)
Kognitiivinen käyttämistera- pia	0	TAV	paino, syömis- häiriöihin liit- tyvät oireet	B	(Galswort- hy-Francis ja Allan 2014)
Kognitiivinen käyttämistera- pia tai psykody- naaminen tai inter- persoonallinen terapia	0	TAV	paino, fyysiset mittaukset	B	(Ebeling 2014)
	-	TAV	toimintakyky	B	(Ebeling 2014)
Hyväksymis- ja omistautumistera- pia	0	TAV	paino, syömis- häiriöön liitty- vät oireet	C	(Parling ym. 2016)
Tietoinen läsnäolo (mindfulness)	+	?	ahdistuneisuus, toipumisen edistyminen	C	(Koskinen ja Meskanen 2014)
Perheterapia (nuoret)	+	TAV	paino	B	(Costa ja Melnik 2016)
Kognitiivinen kuntoutus (Cogni- tive remediation)	+	TAV	kognitiivinen joustavuus, kyky tulkita sosiaalisia ja tunneperäisiä yhteyksiä	C	(Tchanturia ym. 2014)

30. Ahmimishäiriö (bulimia)

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin ver- rattu- na?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kognitiivinen käyt- tämisterapia	+	?	bulimisten oireiden vähentäminen	B	(Dragioti ym. 2017; Ebeling 2014)
• ohjattuna itse- hoitona	+	TAV (itse- hoito)	oireiden vähentäminen	A	(Hay ym. 2009)
• ohjattuna netti- terapiana	0	TAV	ahminta, bulimisten oireiden vähentäminen	B	(Wagner ym. 2013; Ruwaard ym. 2013)
Muu psykoterapia (ei kognitiivinen käyttämisterapia)	+	EI	oireiden vähentäminen	A	(Hay ym. 2009)

31. Lihavan ahmimishäiriö (binge eating disorder)

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Psykoteraapia + lääke	0	LÄÄ	ahminnan vähe- neminen	B	(Koskinen ja Haapsalo-Pesu 2014)
Kognitiivinen käyt- tämismisterapia	+	EI	ahminnan vähe- neminen	B	(Meskanen 2014a; Wagner ym. 2016)
• ryhmämuotoinen	0	MUU (pai- nonpu- dotusoh- jelma)	ahminnan vähe- neminen, paino	B	(Meskanen 2014b)
Dialektinen käyttä- mismisterapia, ryh- mämuotoinen	+	EI	ahminnan vähe- neminen	C	(Meskanen 2014c)

Persoonallisuushäiriöiden psykososiaalinen hoito

32. Persoonallisuushäiriöt yleisesti

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykotera- piamuodot	+	TAV	?	A	(Budge ym. 2013)
Psykodynaamiset ja kognitiivis- behavioraaliset ly- hytterapiat	+	?	itsetunto, vihai- suuden vähenemi- nen, vuorovaiku- tussuhteet	A	(Roine ja Kor- keila 2015)

33. Epävakaa persoonallisuus

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotu- los</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykotera- piamuodot	+	TAV	oirekuvan lievittymi- nen, itsensä vahin- goittamisen ja itse- murhayritysten vähe- neminen	C	(Cristea ym. 2017; Stoffers ym. 2012)
• pitkäkestoi- nen psykote- rapia	0	TAV	persoonallisuushäiri- ön oireet	D	(Karlsson 2015; Linde- man 2015a)
• ryhmäterapia	+	TAV	oirekuvan lievittymi- nen	C	(Boudreau ym. 2009)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia	0	TAV	itsensä vahingoittamisen väheneminen, oirekuvan lievittyminen, itsemurhayritysten väheneminen	B	(Cristea ym. 2017; Lindeman 2015a)
• potilailla joilla myös päihdeongelma	+	TAV	itsensä vahingoittamisen ja päihteiden käytön väheneminen, toimintakyvyn paraneminen	C	(Lee ym. 2015)
Dialektinen käyttäytymisterapia	+	TAV	oirekuvan lievittyminen, vihansäätely ja itsensä vahingoittamisen väheneminen	A	(Cristea ym. 2017; Lindeman 2015b)
• naisilla, joilla myös päihderiippuvuusdiagnoosi	+	TAV	päihteiden käytön väheneminen	B	(Lindeman 2015c)
Skeematerapia	+	TAV, MUU	ahdistuneisuus ja masennusoireet, elämänlaatu	B	(Lindeman 2015d)
	+	?	skeemojen väheneminen	C	(Taylor ym. 2016)
• potilailla, joilla myös päihderiippuvuusdiagnoosi	+	TAV	päihteiden käytön väheneminen	C	(Lee ym. 2015)
• potilailla, joilla myös päihderiippuvuusdiagnoosi	0	TAV	toimintakyky	C	(Lee ym. 2015)
Mentalisaatioterapia	+	TAV (hoitosuosituksen mukainen hoito)	riskikäyttäytyminen, toimintakyky	B	(Korkeila ja Karlsson 2015a)
• potilailla, joilla yhtäikainen epäsoσιαalinen käyttöshäiriö	+	TAV	itsemurhayritysten ja itsensä vahingoittamisen väheneminen	C	(Bateman ym. 2016)
Psykodynaamiset terapiat	+	TAV	oirekuvan lievittyminen, itsensä vahingoittamisen ja itsemurhayritysten väheneminen	B	(Cristea ym. 2017)
Transferenssikeskeinen psykoterapia	+	MUU	itsemurhayritysten väheneminen, oireiden lievittyminen, sairaalajaksojen lyheneminen	B	(Korkeila ja Karlsson 2015b)
Lyhyt psykopedagogiivinen terapia	+	TAV (odotuslista)	impulsiivisuus, ihmissuhteiden myrskyisyys	C	(Koivisto 2015a)

STEPP-ohjelma (Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving) + tavanomainen hoito	+	TAV	oirekuvan lievittyminen, elämänlaatu	B	(Koivisto 2015b)
--	---	-----	--------------------------------------	----------	------------------

34. Epävakaat oireet nuorilla

<i>Hoito</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Dialektinen käyttäytymisterapia	0	TAV	Epävakaiden oireiden väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Kognitiivisanalyttinen psykoterapia	+	TAV	Epävakaiden oireiden merkittävä väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Tunteiden säätelyn taitoryhmä yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon	0	TAV	Epävakaiden oireiden väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Mentalisaatioon perustuva terapia	+	TAV	Epävakaiden oireiden väheneminen	C	Strandholm ym. 2016
Vanhemmille suunnattu kasvatuseuvonta	+	EI	lapsen häiriökäyttäytymisen väheneminen, väkivaltaisten kasvatustapojen väheneminen	A	Arvonen ja Korkeila 2015

35. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö

<i>Hoito (potilasryhmä)</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
KKT + tavanomainen hoito	+	<i>TAV</i>	negatiiviset kokaiininäytteet	C	(Gibbon ym. 2010)
	0	<i>TAV</i>	aggressiivisuus, päihteiden väärinkäytön väheneminen, sosiaalinen toimintakyky	D	(Gibbon ym. 2010)
KKT + palkkiohoito + tavanomainen hoito	+	<i>TAV</i>	negatiiviset kokaiininäytteet	D	(Gibbon ym. 2010)
Palkkiohoito + tavanomainen hoito	+	<i>TAV</i>	sosiaalisen toimintakyvyn paraneminen, negatiiviset kokaiininäytteet	B	(Gibbon ym. 2010)

	0	<i>TAV</i>	negatiiviset opiaattinäytteet	B	(Gibbon ym. 2010)
Psykoedukaatio	0	<i>TAV</i>	impulsiivisuus, vihamielisyys, sosiaalinen toimintakyky	D	(Gibbon ym. 2010)

Lapsuus- tai nuoruusiässä alkavaneiden käytös- ja tunnehäiriöiden psykososiaalinen hoito

36. Käytöshäiriöt

<i>Hoito (potilasryhmä)</i>	<i>Vaikuttavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Kaikki psykoterapiamuodot					
• kohdistuu lapseen	+	EI, TAV	käytöshäiriöiden väheneminen	C	(Epstein 2015)
• kohdistuu vanhempiin	+	EI, TAV	käytöshäiriöiden väheneminen	B	(Epstein 2015)
• kohdistuu lapseen ja vanhempiin	+	EI, TAV	käytöshäiriöiden väheneminen	B	(Epstein 2015)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia	+	EI, MUU	agressiivisen käytöksen ja uusintarikollisuuden väheneminen	A	Lindberg ym. 2015
• laitoksissa asuvilla rikoksiin syylistyneillä nuorilla	0	TAV	uusintarikollisuus	B	(Armeliuss ja Andreassen 2007)
Ryhmämuotoiset vanhemmuutta kehittävät behavioraaliset ja kognitiivis-behavioraaliset interventiot 3-12 vuotiaiden lasten vanhemmille	+	EI	lapsen oireet, vanhemman mielenterveys, paremmat vanhemmuuskäytännöt	A	(Furlong ym. 2012)
Perheterapiat	+	TAV, MUU	nuorisoriikollisuuden ja aggressiivisen käyttäytymisen väheneminen	B	Lindberg ym. 2015
Multisysteeminen terapia	+	TAV	antisosiaalisen ja rikollisen käyttäytymisen väheneminen, uhmakkuushäiriön ja käyttöshäiriön oireiden väheneminen	B	Lindberg ym. 2015

Multidimensionaalinen perhekotihoito	+	TAV	Käytöshäiriön väheneminen	B	Lindberg ym. 2015
Mediavälitteiset behavioraaliset interventiot	+	EI	käytöshäiriöiden väheneminen	A	(Montgomery ym. 2006)
Psykodynaaminen psykoterapia	+	EI, TAV, MUU, LÄÄ	remission saavuttaminen	C	Lindberg ym. 2015

37. Lasten sosiaalisten vuorovaikutusten häiriö

<i>Hoito (potilasryhmä)</i>	<i>Vaikutavuus</i>	<i>Mihin verrattuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoitotulos</i>	<i>Näytön aste</i>	<i>Lähde</i>
Videopalaute vanhemmille/huoltajille	+	EI, TAV, MUU	turvallinen kiinnittyminen	C	(NICE 2015)
	+	EI, TAV, MUU	reagoitakyky/herkkyys	C	(NICE 2015)
Vanhempi/lapsi psykoterapia	+	EI, TAV	turvallinen kiinnittyminen	D	(NICE 2015)
	+	MUU (kotikäynnit)	turvallinen kiinnittyminen	D	(NICE 2015)
Vanhempien herkkyys- ja käyttäytymisterapia	+	EI, TAV, MUU	turvallinen kiinnittyminen	B	(NICE 2015)
	+	EI, TAV, MUU	reagoitakyky/herkkyys	B	(NICE 2015)
Kotikäynnit	+	EI, TAV	turvallinen kiinnittyminen	B	(NICE 2015)
	+	EI, TAV	reagoitakyky/herkkyys	C	(NICE 2015)
Vanhemman kognitiivinen käyttäytymisterapia	0	EI, TAV	turvallinen kiinnittyminen	C	(NICE 2015)
	+	EI, TAV	reagoitakyky/herkkyys	D	(NICE 2015)
Vanhemman neuvonta	0	TAV	turvallinen kiinnittyminen	C	(NICE 2015)

38.ADHD

<i>Hoito</i> (potilasryhmä)	<i>Vaikutta- vuus</i>	<i>Mihin verrat- tuna?</i>	<i>Tavoiteltu hoito- tulos</i>	<i>Näy- tön aste</i>	<i>Lähde</i>
Käyttäytymisterapiat	+	?/EI	ADHD:n ydinoi- reet	B	(Puustjärvi 2011a; CADTH 2011; ; Sprich ym. 2016)
	-	LÄÄ	ADHD:n ydinoi- reet	A	(Puustjärvi 2011b)
• vanhempiin kohdistuvat in- terventiot	+	EI	lapsen ADHD- oireet, vanhem- man oireet	B	(Mulqueen ym. 2015)
• nettiterapiat	+	EI	käytösongelmien vähentyminen, ADHD:n ydinoi- reet	A	(Montgomery ym. 2006; Pettersson ym. 2017)
Käyttäytymisterapia+ lääkehoito	0	LÄÄ	ADHD:n ydinoi- reet	A	(Puustjärvi 2011c)
Työmuistin, toimin- nan ja tarkkaavuuden harjoitus (lapset)	0	EI, TAV	lyhytmuistin, tarkkaavuuden, käytöksen ja kog- nitiivisten taitojen kehittyminen	C	(Rapport ym. 2013)
Sosiaalisten taitojen opettelu +/- lääkehoi- to	0	?	sosiaaliset taidot, ydinoireet, opetta- jan arvio käyttäy- tymisestä	B	(Storebø ym. 2011)
Perheterapia	0	?	ADHD:n ydinoi- reet	B	(Pihlakoski 2011)
Psykoedukaatio	+	EI	ADHD:n ydinoi- reet, tarkkaavuus ja kliininen tila (clinical functio- ning)	C	(Ferrin ym. 2016)
	+	EI	ADHD:n ydinoi- reet	B	(Montoya ym. 2014)
	0	EI	toimintakykyyn liittyvät oireet	B	(Montoya ym. 2014)
EEG-biopalautehoito	+	?	ADHD:n ydinoi- reet	C	(Virkkunen 2011)
Meditaatioterapia	0	LÄÄ	ADHD:n ydinoi- reet	D	(Krisanapra- kornkit ym. 2010)

Taulukon lukuohjeita

1. sarake: Hoitomuoto

Psykoterapiat/Käyttätymisterapiat: merkitään, kun vaikuttavuusarvioon on sisällytetty useita eri terapiamuotoja

Joidenkin terapioiden kohdalla on eri riveillä ilmoitettu tuloksia koskien eri kohderyhmiä, toteutustapoja (esim. nettiterapia) tai käyttötarkoituksia (esim. ylläpitohoito).

2. sarake: Vaikuttavuus

+ merkitään, kun katsauksessa on tilastollisesti merkitsevä tulos lopputulosmuuttujan suhteen terapian hyväksi. Merkitsevyyden raja (nollahypoteesin todennäköisyys) oli katsauksissa 5 % tai pienempi.

- merkitään, kun katsauksessa on tilastollisesti merkitsevä tulos lopputulosmuuttujan suhteen verrokin hyväksi.

0 merkitään, kun katsauksessa ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä lopputulosmuuttujan suhteen.

? merkitään, kun aiheesta ei löytynyt lainkaan vaikuttavuutta mittaavia tutkimuksia

3. sarake: Verrokki

TAV=tavanomainen hoito

EI= ei hoitoa (yleensä odotuslista)

MUU= muu psykososiaalinen hoito tai kuntoutus

LÄÄ= lääke

LUME= lumelääke tai lumepsykoterapia

TTE= tutkittava terapia. Käytetään silloin kun terapian ja lääkkeen yhdistelmää on verrattu pelkkään terapiaan

Sulkuihin on merkitty verrokki-intervention sisältö tarkemmin, silloin kun se tuo oleellista lisätietoa.

4. sarake: Tulosuuttuja

Tulosmuuttujaksi valittu katsauksen päälopputulosuuttuja (joka yleensä oire) ja toimintakyky- tai elämänlaatumuuttuja silloin, kun sellainen on ilmoitettu.

5. sarake: Näytön aste

A-D koodilla viitataan Käypä hoito -suosituksissa, Lääkärin tietokannoissa ja kansainvälisesti monissa hoitosuosituksissa käytettyyn näytön asteen määrittelyyn.

A = Vahva tutkimusnäyttö: useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaisia.

B = Kohtalainen tutkimusnäyttö: ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia.

C = Niukka tutkimusnäyttö: ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus.

D = Ei tutkimusnäyttöä: asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia.

Lähteen ilmoittamaa A-D-koodia käytetään sellaisenaan. Jos lähde käyttää jotain muuta näytön asteen arviointitapaa, työryhmä on muuntanut raportoidun näytönasteen A-D koodiksi (Kts. liite 8. Näytön asteen määrittely). Jos lähde ei ole arvioinut näytön astetta, työryhmä on tehnyt sen GRADE-ohjeiden mukaisesti (Jousimaa 2014).

6. sarake: Lähde tai lähteet

Tuorein systemoitu katsaus, Käypä hoito -suositukseen näytönastekatsaus (NAK) ja/tai satunnaistetut tutkimukset, joiden perusteella vaikuttavuustulos ja näytön asteen arviointi on tehty.

Lähteet

- Abbass, A., A., Kisely S., R., Town J. M., Leichsenring, F., Driessen, E., De Maat, S., Gerber, A., Dekker, J., Rabung, S., Rusalovska, S., Crowe, E. 2014. Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders, *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Alho, H. 2012. Metamfetamiiniriippuvuuden psykososiaalinen hoito. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Armeliu s, B., Andreassen Tore, H. 2007. Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior in youth in residential treatment. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Ballesio A., Aquino MRJV., Feige B., Johann AF., Kyle SD., Spiegelhalder K., Lombardo C., Rücker G., Riemann D., Baglioni C. 2017. The effectiveness of behavioural and cognitive behavioural therapies for insomnia on depressive and fatigue symptoms: A systematic review and network meta-analysis. *Sleep Med Rev.* Feb 7.
- Barton, S., Karner, C., Salih, F., Baldwin, D., Edwards, S. 2014. Clinical effectiveness of interventions for treatment-resistant anxiety in older people: a systematic review. vol. 18:50. S.1-59.
- Bateman, A., O'Connell, J., Lorenzini, N., Gardner, T., Fonagy, P. 2016. A randomised controlled trial of mentalization-based treatment versus structured clinical management for patients with comorbid borderline personality disorder and antisocial personality disorder. *BMC Psychiatry*, vol. 16. S.304.
- Baumeister, H., Hutter, N., Bengel, J. 2011, Psychological and pharmacological interventions for depression in patients with coronary artery disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Baumeister, H., Hutter, N., Bengel, J. 2012. Psychological and pharmacological interventions for depression in patients with diabetes mellitus and depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Benishek, L.A., Dugosh, K.L., Kirby, K.C., Matejkowski, J., Clements, N.T., Seymour, B.L., Festinger, D.S. 2014. Prize-based contingency management for the treatment of substance abusers: A meta-analysis. *Addiction*, vol. 109:9. S. 1426–1436.
- Bennett, K., Manassis, K., Duda, S., Bagnell, A., Bernstein, G.A., Garland, E.J., Miller, L.D., Newton, A., Thabane, L., Wilansky, P. 2016. Treating child and adolescent anxiety effectively: Overview of systematic reviews. *Clinical psychology review*, vol. 50. S. 80–94.
- Boudreau, R., Spry, C., Banks, R. 2009. Group therapy for adults with axis II disorders: a review of clinical effectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 2009.
- Boumparis N., Karyotaki E., Schaub MP., Cuijpers P., Riper H. 2017. Internet interventions for adult illicit substance users: a meta-analysis. *Addiction*. Mar 10. doi: 10.1111/add.13819
- Budge SL., Moore JT., Del Re AC., Wampold BE., Baardseth TP., Nienhuis JB. 2013. The effectiveness of evidence-based treatments for personality disorders when comparing treatment-as-usual and bona fide treatments. *Clin Psychol Rev.* Dec;33(8):1057-66
- CADTH. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 2012. Neurofeedback and biofeedback for post-traumatic stress disorder, generalized anxiety disorder, and depression: a review of the clinical evidence and guidelines. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 2012.
- CADTH. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 2014. Neuro-linguistic programming for the treatment of adults with post-traumatic stress disorder, general anxiety disorder, or depression: a review of clinical effectiveness and guidelines. Ottawa. 2014.

- CADTH. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 2011. Pharmacological and non-pharmacological therapies for adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: systematic review and meta-analysis of clinical evidence.
- Cooper, K., Chatters, R., Kaltenthaler, E., Wong, R. 2015. Psychological and psychosocial interventions for cannabis cessation in adults: a systematic review short report. *Health technology assessment (Winchester, England)*, vol. 19:56. S. 1–130.
- Costa, M.B., Melnik, T. 2016. Effectiveness of psychosocial interventions in eating disorders: an overview of Cochrane systematic reviews. *Einstein*, vol. 14:2. S. 235–277.
- Cowlshaw, S., Merkouris, S., Dowling, N., Anderson, C., Jackson, A., Thomas, S. 2012. Psychological therapies for pathological and problem gambling, *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Cuijpers P, Koole SL, van Dijke A, Roca M, Li J, Reynolds CF 3rd. 2014a. Psychotherapy for subclinical depression: meta-analysis. *Br J Psychiatry*. Oct;205(4):268–74.
- Cuijpers P, Karyotaki E, Pot AM, Park M, Reynolds CF 3rd. 2014b. Managing depression in older age: psychological interventions. *Maturitas*. Oct;79(2):160–9.
- Cristea, I.A., Gentili, C., Cotet, C.D., Palomba, D., Barbui, C., Cuijpers, P. 2017. Efficacy of Psychotherapies for Borderline Personality Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Psychiatry*, vol. 74:4. S. 319–328.
- Darker, C.D., Sweeney, B.P., Barry, J. M., Farrell, M.F., Donnelly-Swift, E. 2015. Psychosocial interventions for benzodiazepine harmful use, abuse or dependence. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Das, J.K., Salam, R.A., Lassi, Z.S., Khan, M.N., Mahmood, W., Patel, V., Bhutta, Z.A. 2016. Interventions for adolescent mental health: An overview of systematic reviews. *Journal of Adolescent Health*, vol. 59:4, S. 49–S60.
- Dennis, C., Hodnett, E.D. 2007. Psychosocial and psychological interventions for treating postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Dragioti, E., Karathanos, V., Gerdle, B., Evangelou, E. 2017. Does psychotherapy work? An umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1–11. Online ISSN: 1600-0447
- Dugosh, K., Abraham, A., Seymour, B., McLoyd, K., Chalk, M., Festinger, D. 2016. A Systematic Review on the Use of Psychosocial Interventions in Conjunction With Medications for the Treatment of Opioid Addiction. *Journal of Addiction Medicine*, vol. 10:2. S. 93–103.
- Ebeling, H. 2014. Kognitiivis-behavioraalisen, psykodynaamisen ja interpersoonallisen terapian sekä tavanomaisen hoidon teho laihuushäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Epstein R, Fennesbeck C, Potter S. 2015. Psychosocial Interventions for Child Disruptive Behaviors: A Meta-analysis. *Pediatrics*, vol. 136:5. S. 825–827.
- Ferrin, M., Perez-Ayala, V., El-Abd, S., Lax-Pericall, T., Jacobs, B., Bilbow, A., Taylor, E. 2016. A Randomized Controlled Trial Evaluating the Efficacy of a Psychoeducation Program for Families of Children and Adolescents with ADHD in the United Kingdom: Results After a 6-Month Follow-Up. *Journal of Attention Disorders*, February 2016. S. 1–12.
- Forneris Catherine, A., Nussbaumer, B., Kaminski-Hartenthaler, A., Morgan Laura, C., Gaynes Bradley, N., Sonis Jeffrey, H., Greenblatt, A., Wipplinger, J., Lux Linda, J., Winkler, D., Van Noord Megan, G., Hofmann, J., Gartlehner, G. 2015. Psychological therapies for preventing seasonal affective disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Furlong, M., McGilloway, S., Bywater, T., Hutchings, J., Smith Susan, M., Donnelly, M. 2012. Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.

- Galsworthy-Francis, L., Allan, S. 2014. Cognitive Behavioural Therapy for anorexia nervosa: a systematic review. *Clinical psychology review*, vol. 34:1. S. 54–72.
- Gibbon, S., Duggan, C., Stoffers, J., Huband, N., Völlm Birgit, A., Ferriter, M., Lieb, K. 2010. Psychological interventions for antisocial personality disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Gotink, R.A., Chu, P., Busschbach, J.J.V., Benson, H., Fricchione, G.L., Hunink, M.G.M. 2015. Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: An overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. *PLoS ONE*, vol. 10: 4. S. Art e0124344–17.
- Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, Arensman E, Gunnell D, Townsend E, van Heeringen K, Hazell P. Interventions for self-harm in children and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2015, Issue 12. Art. No.: CD012013. DOI: 10.1002/14651858.CD012013.
- Hawton, K., Witt, K., G., Taylor Salisbury, T. L., Arensman, E., Gunnell, D., Hazell, P., Townsend, E., van Heeringen, K. 2016. Psychosocial interventions for self-harm in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Hay, P.J., Claudino, A.M., Touyz, S., Abd Elbaky, G. 2015. Individual psychological therapy in the outpatient treatment of adults with anorexia nervosa. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Hay, P.J., Bacaltchuk, J., Stefano, S., Kashyap, P. 2009. Psychological treatments for bulimia nervosa and bingeing. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Health Quality Ontario. 2015. Cognitive-Behavioural Therapy for Anxiety and Depression in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A Rapid Review. February 2015. S. 1–21.
- Honkonen, T., Pasternack, I. 2008. Ratkaisukeskeisen terapian vaikutus depression hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Honkonen, T. 2007. Psykososiaaliset hoitomuodot kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Hunt, G.E., Siegfried, N., Morley, K., Sitharthan, T., Cleary, M. 2013. Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Ipsen Jonathan, C., Sander, C., Stein Dan, J. 2009. Pharmacotherapy and psychotherapy for body dysmorphic disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Isoaho, R. 2014. Kognitiivisten ja altistavien hoitojen asema PTSD:n hoidossa iäkkäillä. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Jonas, D., Cusack, K., Forneris, C., Wilkins, T., Sonis, J., Middleton, J., Feltner, C., Meredith, D., Cavanaugh, J., Brownley, K., Olmsted, K., Greenblatt, A., Weil, A., Gaynes, B. 2013. Comparative effectiveness of psychological treatments and pharmacological treatments for adults with posttraumatic stress disorder (PTSD). *Comparative Effectiveness Review* 92.
- Jousimaa, J., Liira, H., Liira, J. & Komulainen, J. 2010. Hoitosuosituksen näytönasteen ja vahvuuden arviointi GRADE-työryhmän tapaan. *Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim*, vol. 1.
- Justo, L., Soares Bernardo Garcia de, O., Calil, H. 2007. Family interventions for bipolar disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Kajaste, S. 2014. Ikääntyneiden unettomuuden lääkkeetön hoito. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Karlsson, H. 2015. Pitkäkestoinen psykoterapia. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Karyotaki, E., Riper, H., Twisk, J., Hoogendoorn, A., Kleiboer, A., Mira, A., Mackinnon, A., Meyer, B., Botella, C., Littlewood, E., Andersson, G., Christensen, H., Klein, J.P., Schröder, J., Breton-Lopez, J., Scheider, J., Griffiths, K., Farrer, L., Huibers, M.J., Phillips, R.,

- Gilbody, S., Moritz, S., Berger, T., Pop, V., Spek, V., Cuijpers, P. 2017. Efficacy of Self-guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Depressive Symptoms: A Meta-analysis of Individual Participant Data. *JAMA psychiatry*, vol. 74:4. S. 351–359.
- Klimas J., Tobin H., Field CA., O’Gorman CS., Glynn LG., Keenan E., Saunders J., Bury G., Dunne C., Cullen W. 2014. Psychosocial interventions to reduce alcohol consumption in concurrent problem alcohol and illicit drug users. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Koivisto, M. 2015a. Lyhyt psykoedukatiivinen interventio epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Koivisto, M. 2015b. Stepps-ohjelma epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Koponen, H., Kinnunen. E. 2014. Kognitiivinen remediaatio depression hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Korkeila, J., Karlsson, H. 2015a. Mentisaatioterapia epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Korkeila, J., Karlsson, H. 2015b. Transferenssifokusoitunut psykoterapia epävakaassa persoonallisuushäiriössä. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Koskinen, M., Haapsalo-Pesu, K. 2014. Masennuslääkkeet ja psykoterapia ahmimishäiriössä. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Koskinen, M., Meskanen, K. 2014. Mindfulness-menetelmä (hyväksyvä tietoinen läsnäolo, tietoisuustaidot) syömishäiriöiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Krisanaprakornkit, T., Ngamjarus, C., Witoonchart, C., Piyavhatkul, N. 2010. Meditation therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Lee, N.K., Cameron, J., Jenner, L. 2015. A systematic review of interventions for co-occurring substance use and borderline personality disorders. *Drug and Alcohol Review*, vol. 34:6. S. 663–672.
- Lee, N.K., Rawson, R.A. 2008. A systematic review of cognitive and behavioural therapies for methamphetamine dependence. *Drug and Alcohol Review*, vol. 27:3. S. 309–317.
- Linardon, J., Brennan, L. 2017. The effects of cognitive-behavioral therapy for eating disorders on quality of life: A meta-analysis. *International Journal of Eating Disorders*. April 21.
- Lindeman, S. 2015a. Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, epävakaata persoonallisuutta ja itsensä vahingoittaminen. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindeman, S. 2015b. Dialektinen käyttäytymisterapia, epävakaata persoonallisuushäiriö, vihan säätely ja itsensä vahingoittaminen. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindeman, S. 2015c. Dialektinen käyttäytymisterapia, epävakaata persoonallisuushäiriö ja päihitteiden käyttö. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindeman, S. 2015d. Skeemakeskeinen psykoterapia ja epävakaata persoonallisuushäiriö. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O., Stenberg, J. 2014a. Tietotekniikka-avusteiden terapiat masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014a. Kognitiivinen ja interpersonaalinen terapia masennustilojen akuuttivaiheen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014b. Puhelimitse toteutettu psykoterapia masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

- Lindfors, O. 2014c. Psykoterapian teho vanhusten depression hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014d. Psykoterapia synnytyksen jälkeisen depression hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014e. Psykoterapian teho somaattisen sairauden yhteydessä esiintyvän masennuksen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014f. Psykoterapian yhdistäminen lääkehoitoon. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014g. Akuuttivaiheen kognitiivinen psykoterapia uusiutumisen ehkäisemisessä. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014i. Käyttäytymisen aktivointi masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014j. Ongelmanratkaisuterapia masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014k. Psykoedukaatio ja itseapuoppaat masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014l. Hyväksymis- ja omistautumisterapia masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014m. Pari- ja perheterapiat masennuksen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O. 2014n. Kroonisen masennuksen hoito kognitiivis-behavioraalilla CBASP-terapialla. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O., Stenberg, J. 2014b. Pitkäkestoisen psykodynaamisen psykoterapian käyttö masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Lindfors, O., Stenberg, J. 2014c. Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia masennustilojen hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- MacDonald, G., Higgins Julian, P.T., Ramchandani, P., Valentine Jeffrey, C., Bronger Patricia, P., Klein, P., O'Daniel, R., Pickering, M., Rademaker, B., Richardson, G., Taylor, M. 2012. Cognitive-behavioural interventions for children who have been sexually abused: A Systematic Review. Campbell Systematic Reviews. doi: 10.4073/csr.2012.14
- Marttunen, M. 2014a. Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia nuorten depressioiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Marttunen, M. 2014b. Nuorten depression jatko- ja estohoito kognitiivisellä terapialla. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Marttunen, M. 2014c. Masennuslääkkeen ja kognitiivisen psykoterapian yhdistäminen nuorten depression hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Marttunen, M. 2014d. Interpersoonallinen yksilöterapia nuorten depression hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Marttunen, M. 2014e. Nuorten yhdelle SSRI-lääkkeelle resistentin depression hoito. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Marttunen, M. 2014f. Supportiivinen psykoterapia nuorten depressioiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Marttunen, M. 2014g. Perheterapia nuorten depressioissa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Mayo-Wilson, E., Montgomery, P. 2013. Media-delivered cognitive behavioural therapy and behavioural therapy (self-help) for anxiety disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- McLoughlin Benjamin, C., Pushpa-Rajah Jonathan, A., Gillies, D., Rathbone, J., Variend, H., Kalakouti, E., Kyprianou, K. 2014. Cannabis and schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews.

- Mehlum L, Tørmoen A, Ramberg M ym. Dialectical behavior therapy for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: a randomized trial. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2014;53:1082-91.
- Mehlum L, Ramberg M, Tørmoen AJ, Haga E, Diep LM, Stanley BH, Miller AL, Sund AM, Grøholt B. Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents With Repeated Suicidal and Self-Harming Behavior: Outcomes Over a One-Year Follow-Up. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2016 Apr;55(4):295-300.
- Meskanen, K. 2014a. Kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia ahmintahäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Meskanen, K. 2014b. Ryhmämuotoinen kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) ahmintahäiriön (BED) hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Meskanen, K. 2014c. Ryhmämuotoinen dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ahmintahäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Montgomery, P., Bjornstad Gretchen, J., Dennis Jane, A. 2006. Media-based behavioural treatments for behavioural problems in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Montoya, A., Hervas, A., Fuentes, J., Cardo, E., Polavieja, P., Quintero, J., Tannock, R. 2014. Cluster-randomized, controlled 12-month trial to evaluate the effect of a parental psychoeducation program on medication persistence in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuropsychiatric Disease & Treatment*, vol. 10. S. 1081–1092.
- Mujoomdar M, Spry C. 2009. Group therapy for anxiety: a review of the clinical effectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 2009.
- Mulqueen, J.M., Bartley, C.A., Bloch, M.H. 2015. Meta-analysis: parental interventions for preschool ADHD. *Journal of Attention Disorders*, vol. 19:2. S. 118–124.
- Murphy G, Spry C. Group therapy for mood disorders: a review of the clinical effectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 2009
- Murphy, S. M., Irving Claire, B., Adams Clive, E., Waqar, M. 2015. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- NICE. National Institute for Health and Clinical Excellence. 2015. Clinical Guidelines. Children's Attachment: Attachment in Children and Young People Who Are Adopted from Care, in Care or at High Risk of Going into care. Clinical Guideline 26. Saatavissa: <http://www.nice.org>
- NICE. National Institute for Health and Clinical Excellence. 2011. Alcohol dependence and harmful alcohol use: full guideline. Saatavissa: <http://www.nice.org>.
- Niemelä, S., Aalto, M. 2012. Opioidien väärinkäyttäjien ja opioidiriippuvaisten psykososiaaliset hoidot. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Noorani, H., Severn, M. 2010. Cognitive behavioural therapy for patients with addictions: a review of the clinical and cost-effectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 2010.
- Okpokoro, U., Adams Clive, E., Sampson, S. 2014, Family intervention (brief) for schizophrenia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Oksanen, J. 2013a. Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) psykoosioireiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Oksanen, J. 2013b. Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Oksanen, J. 2013c. Psykodynaaminen perheterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

- Oksanen, J. 2013d. Supportiivinen terapia skitsofreniapotilaan hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Oksanen, J. 2013e. Psykoedukatiiviset perheinterventiot skitsofreniapotilaan hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Oksanen, J. 2013f. Mielialahäiriöjakson varomerkkioireiden tunnistus. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Ollila, H. 2011a. Nuorten lääkkeettömästä tupakasta vieroituksen interventiot. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Ollila, H. 2011b. Ryhmäohjaus tupakasta vieroituksessa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Olthuis Janine, V., Watt Margo, C., Bailey, K., Hayden Jill, A., Stewart Sherry, H. 2016. Therapist-supported Internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- Orgeta, V., Qazi, A., Spector Aimee, E., Orrell, M. 2014. Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- Ori, R., Amos, T., Bergman, H., Soares-Weiser, K., Ipser Jonathan, C., Stein Dan, J. 2015. Augmentation of cognitive and behavioural therapies (CBT) with d-cycloserine for anxiety and related disorders, John Wiley & Sons, Ltd.
- Parahoo, K., McDonough, S., McCaughan, E., Noyes, J., Semple, C., Halstead Elizabeth, J., Neuberger Molly, M., Dahm, P. 2013. Psychosocial interventions for men with prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- Parling, T., Cernvall, M., Ramklint, M., Holmgren, S., Ghaderi, A. 2016. A randomised trial of Acceptance and Commitment Therapy for Anorexia Nervosa after daycare treatment, including five-year follow-up. BMC Psychiatry, vol. 16. S. 272.
- Pasternack I., Remahl A., Ahovuo-Saloranta A., Isojärvi J., ja Mäkinen E. 2017. Krooninen väsymysoireyhtymä. Etiologia, diagnostiikka, hoito sekä kuntoutusinterventiot. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 3, 2017. 978-952-284-023-3 (pdf).
- Perry, A. E., Neilson, M., Martyn-St James, M., Glanville Julie, M., Woodhouse, R., Hewitt, C. 2015. Interventions for female drug-using offenders. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- Pettersson, R., Soderstrom, S., Edlund-Soderstrom, K., Nilsson, K.W. 2017. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adults with ADHD in Outpatient Psychiatric Care. Journal of Attention Disorders, vol. 21:6. S. 508-521.
- Pihlakoski, L. 2011. Perheterapia ADHD:n ydinoireiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Pistorello, J., Fruzzetti, A.E., Maclane, C., Gallop, R., Iverson, K.M. 2012. Dialectical behavior therapy (DBT) applied to college students: a randomized clinical trial. Journal of Consulting & Clinical Psychology, vol. 80:6. S. 982-994.
- Pompoli, A., Furukawa Toshi, A., Imai, H., Tajika, A., Efthimiou, O., Salanti, G. 2016. Psychological therapies for panic disorder with or without agoraphobia in adults: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- Ponteva, M. 2014. Ryhmäterapian tehokkuus traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Pu, J., Zhou, X., Liu, L., Zhang, Y., Yang, L., Yuan, S., Zhang, H., Han, Y., Zou, D., Xie, P. 2017. Efficacy and acceptability of interpersonal psychotherapy for depression in adolescents: A meta-analysis of randomized controlled trials. Psychiatry Res, Mar 16. S. 226-232
- Punamäki, R. 2014. Psykoterapia traumaperäisen stressihäiriön hoidossa aikuisilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

- Puustjärvi, A. 2011a. Käyttäytymishoito ADHD:n ydinoireiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Puustjärvi, A. 2011b. Käyttäytymishoito ADHD:n ydinoireiden hoidossa verrattuna lääkehoitoon. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Puustjärvi, A. 2011c. Yhdistelmähoito ADHD:n ydinoireiden hoidossa verrattuna lääkehoitoon. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Ranta K, Gergov V, Tainio V-M, Lindberg N, Strandholm T, Ehrling L, Marttunen M. Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä. Suomen Lääkärilehti 2015;70(18):1253-1259
- Rappoport, M.D., Orban, S.A., Kofler, M.J., Friedman, L.M. 2013. Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. *Clinical psychology review*, vol. 33:8. S. 1237–1252.
- Reback, C., Peck, J., Dierst-Davies, R., Nuno, M., Kamien, J., Amass, L. 2010. Contingency management among homeless, out-of-treatment men who have sex with men. *Journal of Substance Abuse Treatment*. vol. 39. S. 255–263.
- Roberts, N.P., Roberts Pamela, A., Jones, N., Bisson Jonathan, I. 2016. Psychological therapies for post-traumatic stress disorder and comorbid substance use disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Roine, M., Korkeila, J. 2015. Aikarajoitteiset psykoterapiat (lyhytterapia) persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Ruwaard, J., Lange, A., Broeksteeg, J., Renteria-Agirre, A., Schrieken, B., Dolan, C.V., Emmelkamp, P. 2013. Online cognitive-behavioural treatment of bulimic symptoms: a randomized controlled trial. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, vol. 20:4. S. 308–318.
- Sayegh, C.S., Huey, S.J., Zara, E.J., Jhaveri, K. 2017. Follow-Up Treatment Effects of Contingency Management and Motivational Interviewing on Substance Use: A Meta-Analysis. *Psychology of Addictive Behaviors*. *Psychology of Addictive Behaviors*, vol. 31:4. S. 403–414.
- SBU. Swedish Council on Technology Assessment in Health,Care 2007. Computer-based cognitive behavioral therapy for anxiety disorders or depression - early assessment briefs (Alert). Report 2007-03. S. 19. Saatavissa: <http://www.sbu.se>
- Simojoki, K. 2015. Kognitiivinen käyttäytymisterapia kohtalaisen tai vaikean alkoholiongelman hoidossa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Skapinakis, P., Caldwell, D., Hollingworth, W., Bryden, P., Fineberg, N., Salkovskis, P., Welton, N., Baxter, H., Kessler, D., Churchill, R., Lewis, G. 2016. A systematic review of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of pharmacological and psychological interventions for the management of obsessive-compulsive disorder in children/adolescents and adults. *Health Technology Assessment (Winchester, England)*. vol. 20:43. S.1-392.
- Skelton, M., Khokhar Waqqas, A., Thacker Simon, P. 2015. Treatments for delusional disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Sprich, S.E., Safren, S.A., Finkelstein, D., Remmert, J.E., Hammerness, P. 2016. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for ADHD in medication-treated adolescents. *Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines*, vol. 57:11. S. 1218–1226.
- Stephens, S., Ford, E., Paudyal, P., Smith, H. 2016. Effectiveness of Psychological Interventions for Postnatal Depression in Primary Care: A Meta-Analysis. *Annals of family medicine*, vol. 14:5. S. 463–472.
- Stevenson, M., Scope, A., Sutcliffe, P., Booth, A., Slade, P., Parry, G., Saxon, D., Kalthenthaler, E. 2010. Group cognitive behavioural therapy for postnatal depression: a systematic

- review of clinical effectiveness, cost effectiveness and value of information analyses. vol. 14:44. S. 1–135.
- Stoffers, J. M., Völlm, B. A., Rucker, G., Timmer, A., Huband, N., Lieb, K. 2012. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Storebø Ole, J., Skoog, M., Damm, D., Thomsen Per, H., Simonsen, E., Gluud, C. 2011. Social skills training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Swartz, H.A., Grote, N.K., Graham, P. 2014. Brief Interpersonal Psychotherapy (IPT-B): Overview and review of evidence. *American Journal of Psychotherapy*, vol. 68:4. S. 443–462.
- Tacke, U. 2012. Kannabisriippuvuuden psykososiaalinen hoito. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Tait, R.J., McKetin, R., KayLambkin, F., CarronArthur, B., Bennett, A., Bennett, K., Christensen, H., Griffiths, K.M. 2015. Six-month outcomes of a Web-based intervention for users of amphetamine-type stimulants: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, vol. 17:4. S. 105.
- Taylor, C. D. J., Bee, P. and Haddock, G. 2016. Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. *Psychol Psychother Theory Res Pract*. doi:10.1111/papt.12112
- Tchanturia, K., Lounes, N., Holttum, S. 2014. Cognitive remediation in anorexia nervosa and related conditions: a systematic review. *European Eating Disorders Review*, vol. 22:6. S. 454–462.
- Terplan, M., Ramanadhan, S., Locke, A., Longinaker, N., Lui, S. 2015. Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Thomson, A., Page, L. 2007. Psychotherapies for hypochondriasis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Tran, K., Spry, C. 2009. Group therapy in treatment of Schizophrenia: A Review of the Clinical Effectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 2009.
- Tupala, T. 2013. Kognitiivis-behavioraalinen hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusoireet. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Tuulio-Henriksson, A. 2013. Kognitiivinen remediaatio ja yksi- tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien kuntoutuksessa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- van Dessel, N., den Boeft, M., van der Wouden, J.C., Kleinstäuber, M., Leone, S., S., Terluin, B., Numans Mattijs, E., van der Horst, H., E., van Marwijk, H. 2014. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- van Straten A., van der Zweerde T., Kleiboer A., Cuijpers P., Morin CM., Lancee J. 2017. Cognitive and behavioral therapies in the treatment of insomnia: A meta-analysis. *Sleep Med Rev*. Feb 9. pii: S1087-0792(17)30034-5.
- Virkkunen, L. 2011. Biopalautehoidon (neurofeedback) vaikutus ADHD:n ydinoireisiin. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Vorma, H. 2012. Huumeongelmaisesta potilaan masennuksen psykoterapeuttinen hoito. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Wagner, B., Nagl, M., Dolemeier, R., Klinitzke, G., Steinig, J., Hilbert, A., Kersting, A. 2016. Randomized Controlled Trial of an Internet-Based Cognitive-Behavioral Treatment Program for Binge-Eating Disorder. *Behavior Therapy*, vol. 47:4. S. 500–514.

- Wagner, G., Penelo, E., Wanner, C., Gwinner, P., Trofaier, M., Imgart, H., Waldherr, K., Wober-Bingol, C., Karwautz, A.F.K. 2013. Internet-delivered cognitive-behavioural therapy v. conventional guided self-help for bulimia nervosa: long-term evaluation of a randomised controlled trial. *British Journal of Psychiatry*, vol. 202. S. 135–141.
- Whalley, B., Rees, K., Davies, P., Bennett, P., Ebrahim, S., Liu, Z., West, R., Moxham, T., Thompson David, R., Taylor Rod, S. 2011. Psychological interventions for coronary heart disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Whittaker R., McRobbie H., Bullen C., Rodgers A., Gu Y. 2016. Mobile phone-based interventions for smoking cessation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Wu, H., Yu, D., He, Y., Wang, J., Xiao, Z., Li, C. 2015. Morita therapy for anxiety disorders in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Zhao, S., Sampson, S., Xia, J., Jayaram Mahesh, B. 2015. Psychoeducation (brief) for people with serious mental illness. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.